

Kinderreanimatie en AED

Kinderen mogen op dezelfde manier gereanimeerd worden als volwassenen. Ook hulpverleners die uitzonderingen hebben geleerd, mogen de kinderen toch op de volwassenen manier reanimeren. Het gaat er immers om dat zo snel mogelijk gereanimeerd wordt.

De Automatische Externe Defibrillator (AED) kan bij iedereen vanaf 1 jaar worden gebruikt. Bij kinderen van 1 tot 8 jaar worden bij voorkeur kinderelektroden gebruikt. Sommige AED's hebben aparte mogelijkheden voor kinderen. Zijn de aanpassingen niet aanwezig dan moeten de elektroden voor volwassenen worden gebruikt.

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om het gebruik van een AED bij kinderen onder 1 jaar aan te bevelen.

Eerste Hulp aan Kinderen en AED

Aanpak

Het kind reageert niet op aanspreken en schudden.

Er is geen normale ademhaling en er zijn geen tekenen van leven of u twijfelt sterk.

Laat 112 bellen en de AED halen. Vraag de omstander altijd terug te komen, mocht hij of zij de ruimte verlaten.

Geef 5 beademingen, vervolg met afwisselend 15 borstcompressies en 2 beademingen.

Sluit de AED aan zodra deze aanwezig is. Volg de gesproken of visuele instructies van de AED. (Bij veel AED's betekent dat dan doorgedaan wordt met 30 borstcompressies en 2 beademingen.)

Zijn er geen omstanders aanwezig: bel zelf na 1 minuut reanimeren 112. Gebruik de AED alleen als deze echt binnen handbereik is.

Verdere informatie

Zie voor het reanimeren van kinderen tot 1 jaar (zuigelingen) en de aanpak van beademing en borstcompressies hoofdstuk 7 van Eerste Hulp aan Kinderen. De geheugensteun AED en de AED poster van Het Oranje Kruis worden aanvullend aan dit hoofdstuk gebruikt.