

## Beoordelen van de ademhaling: slachtoffer is bewusteloos

situatie	<p>Het slachtoffer is bewusteloos. Borst en buik gaan regelmatig op en neer, er is een luchtstroom aan de mond waarneembaar en de ademhaling klinkt normaal.</p>	<p>Slachtoffer is bewusteloos, er is geen normale ademhaling. Borst en buik gaan niet of onregelmatig op en neer. Er is geen of slechts af en toe een luchtstroom aan de mond voelbaar. De ademhaling is niet of abnormaal hoorbaar. Het slachtoffer is soms blauw.</p>
conclusie	<p>Het slachtoffer ademt normaal.</p>	<p>Het slachtoffer ademt niet normaal.</p>
actie	<p>Doel eerste hulp afsluiting van de luchtweg voorkomen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Draai het slachtoffer in de stabiele zijligging.</li><li>◆ Laat professionele hulp waarschuwen of doe dat zelf.</li><li>◆ Controleer de ademhaling iedere minuut.</li><li>◆ Ga na of er ernstig uitwendig bloedverlies is en of er tekenen zijn van shock (zie hoofdstuk 6).</li></ul>	<p>Doel eerste hulp zorgen dat zuurstofrijk bloed door de bloedvaten stroomt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Laat onmiddellijk professionele hulp waarschuwen of doe dat zelf. Zeg daarbij dat het om een reanimatie gaat.</li><li>◆ Start met reanimatie (zie hoofdstuk 5).</li><li>◆ Geef 30 borstcompressies.</li><li>◆ Geef 2 beademingen.</li><li>◆ Wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.</li></ul>