

## Verslikken

situatie	<p>Het slachtoffer is bij bewustzijn, benauwd, kan soms praten en hoest effectief. Afwijkende ademgeluiden zijn hoorbaar.</p>	<p>Het slachtoffer hoest niet of niet effectief, is (zeer) benauwd en angstig, hij ademt abnormaal hoorbaar, of helemaal niet, of hij grijpt met uitpuilende ogen naar zijn keel (meestal tijdens het eten).</p>
conclusie	<p>Het slachtoffer heeft een gedeeltelijke afsluiting van de luchtweg.</p> <p>Doel eerste hulp de luchtweg volledig vrijmaken</p>	<p>Het slachtoffer heeft een afsluiting van de luchtweg.</p> <p>Doel eerste hulp de luchtweg vrijmaken en daarna vrijhouden</p>
actie	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Zet aan tot hoesten.</li><li>◆ Controleer de ademhaling totdat de afsluiting is opgeheven.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Geef maximaal 5 stoten tussen de schouderbladen.</li><li>◆ Bij geen effect:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ pas maximaal 5 maal de handgreep van Heimlich toe</li><li>▶ blijf deze twee methodes afwisselen, steeds maximaal 5 maal</li></ul></li><li>◆ Bij verlies van bewustzijn:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ begeleid het slachtoffer voorzichtig naar de grond</li><li>▶ zorg voor deskundige hulp</li><li>▶ start reanimatie: 30 borstcompressies afgewisseld met 2 mogelijk niet effectieve beademingen(zie hoofdstuk 5)</li></ul></li></ul>